

第26回 志摩市新型コロナウイルス感染症対策本部会議事項書

日時：令和4年6月27日（月）13：00～

場所：庁議室

1. 本部長挨拶

2. 市内における感染者の発生状況について

3. 今後の感染防止対策について

4. 新型コロナワクチン4回目接種について




5. その他

市内年代別/新規・濃厚接別感染者数

単位：人

	10歳未満		10代		20代		30代		40代		50代		60代		70代		80代		90代		計	県合計
	新規	濃厚接	新規	濃厚接	新規	濃厚接	新規	濃厚接	新規	濃厚接	新規	濃厚接	新規	濃厚接	新規	濃厚接	新規	濃厚接	新規	濃厚接		
5/1～5/7	5	1	2	0	4	1	3	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	24	1,753
5/8～5/14	6	11	9	5	11	1	7	7	2	7	3	0	1	5	1	3	0	1	0	0	80	3,190
5/15～5/21	7	3	8	4	11	0	4	2	3	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	50	2,867
5/22～5/28	2	2	3	2	3	0	3	3	3	2	0	2	2	1	1	2	0	1	0	0	32	2,324
5/29～6/4	9	2	3	1	2	1	5	4	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	31	1,592
6/5～6/11	1	2	1	0	1	0	6	2	5	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	25	1,070
6/12～6/18	1	3	3	0	2	1	10	4	6	0	1	4	5	2	2	0	0	0	0	0	44	986
6/19～6/25	2	4	7	1	5	2	5	6	11	2	1	4	1	3	10	5	0	1	0	0	70	1,135
計	33	28	36	13	39	6	43	28	31	17	11	14	12	14	16	10	0	4	0	1	356	14,917
合計	61		49		45		71		48		25		26		26		4		1		356	
割合	17.1%		13.8%		12.6%		19.9%		13.5%		7.0%		7.3%		7.3%		1.1%		0.3%			

*「濃厚接」は濃厚接触者から陽性となった方



3市の感染者数

単位：人

	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	週合計	県週計
志摩市	6	1	3	4	8	2	7	31	1,592
伊勢市	15	10	8	18	11	10	6	78	
鳥羽市	1	0	1	1	0	0	1	4	
	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	週合計	県週計
志摩市	1	2	1	6	4	5	6	25	1,070
伊勢市	11	7	7	17	8	5	11	66	
鳥羽市	1	0	0	1	2	0	0	4	
	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	週合計	県週計
志摩市	6	4	0	14	7	7	6	44	986
伊勢市	10	16	2	16	13	12	6	75	
鳥羽市	1	0	1	0	0	2	1	5	
	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	週合計	県週計
志摩市	13	12	6	15	16	3	6	71	1,135
伊勢市	13	6	1	16	13	9	13	71	
鳥羽市	1	4	5	10	6	8	3	37	

60歳以上の方や、基礎疾患を有する方へ

新型コロナワクチン接種

4回目接種のお知らせ

接種費用 無料

全額公費



4回目接種により、高い重症化予防効果が得られます。



接種の対象

現時点で得られている科学的知見等により、以下の方が4回目接種の対象となります。

3回目のワクチン接種から5ヶ月以上経過した

① 60歳以上の方 ② 18歳以上で基礎疾患を有する方

その他 重症化リスクが高いと医師が認める方

※①に該当する方は、お住まいの自治体から郵送される接種券を接種会場に持参してください。

※②に該当するか否かについて、

基礎疾患等で医療機関を受診しておられる方や、事前に相談できる医療機関をお持ちの方は、その医療機関の医師にご相談ください。



※重症化リスクが高い具体的な基礎疾患については、厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。

使用するワクチン

1～3回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。

新型コロナワクチンの

効果

- 海外の研究では、3回目接種から4か月以上経過した60歳以上の方にファイザー社ワクチンを4回目接種した場合、オミクロン株流行期において、接種後6週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたと報告されています。

出典: Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

新型コロナワクチンの

安全性

- 海外の研究では、4回目接種後21日目までにおいて、重大な副反応は認めなかったと報告されています。

□ 18歳以上の接種後21日目までに現れた症状

割合	症状
50%以上	疼痛 78.8%
10 - 50%	倦怠感 33.2% 筋肉痛 24.5% 頭痛 21.5% 硬結・腫脹 12.0%
1 - 10%	関節痛 8.4% 37.5度以上の発熱 6.6% リンパ節腫脹 4.7% 紅斑・発赤 8.0% 知覚障害 1.5% アレルギー反応 1.0%

(※) 対象: 274人 (ファイザー社: 154人、モデルナ社: 120人)

出典: Gili Regev-Yochay et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. NEJM. 2022.

◎住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → **医療機関や施設でご相談ください。**
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → **医療機関でご相談ください。**
- ・お住まいが住所地と異なる方 → **実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。**
実際にお住まいの市町村ホームページでご確認いただくか、相談窓口にお問い合わせください。

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には、「3つの密（密集・密接・密閉）」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。

感染予防対策を
継続していただ
くよう願いま
す。



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密（密集・密接・密閉）」の回避



マスクの着用



石けんによる
手洗い



手指消毒用アルコール
による消毒の励行

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



【問い合わせ先】

志摩市新型コロナワクチン電話相談窓口（コールセンター）

電話番号：0599-43-5030 / 受付時間：午前9時～午後8時（土日・祝日も対応）