

## คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา COMIRNATY (วัคซีนไฟเซอร์)

วัคซีนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาโดยรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ผู้สมัครใจสามารถรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม วัคซีนนี้จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ครั้ง

วัคซีนชนิดนี้ มีรายงานผลลัพธ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสในระยะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 95% จึงคาดว่าจะสามารถป้องกันการเกิดอาการหรืออาการกำเริบหนักได้ แต่ทว่ายังไม่ใช้วัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัดต่อไป

นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ หรืออาจต้องใช้ความระมัดระวังในการรับวัคซีนเป็นพิเศษ จึงขอความกรุณาให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาประจำก่อนว่าจะสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่

### 【ผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้】

- ผู้ที่ในวันฉีดวัคซีนมีไข้ที่ปรากฏชัด (หมายถึงการมีไข้สูงกว่าอุณหภูมิ 37.5 หรือสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยปกติอย่างชัดเจน) หรือมีโรคเฉียบพลันร้ายแรง
- ผู้ที่มีประวัติมีอาการแพ้อย่างรุนแรง (เช่น แอนาฟิแล็กซิส) ต่อส่วนประกอบของวัคซีนนี้
- ผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการไม่เหมาะสมในการรับการฉีดวัคซีนนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

### 【ผู้ที่ต้องระมัดระวังในการรับการฉีดวัคซีน】

- ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาโรคใดโรคหนึ่งต่อไปนี้
  - ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ, โรคไต, โรคตับ, โรคเลือด หรือโรคทางพัฒนาการ
  - ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
- ผู้ที่เคยมีอาการต่อไปนี้
  - ผู้ที่เคยมีอาการแพ้ยาหรืออาหารอย่างรุนแรง หรือเคยมีอาการชักระตุก(อาการชัก)

### 【ข้อมูลอื่น】

- ※ ในวัคซีนชนิดนี้มีสารประกอบซึ่งไม่เคยใช้ในวัคซีนชนิดใดมาก่อนผสมอยู่ด้วย หากท่านมีภาวะภูมิไวเกินหรือมีอาการแพ้ยาในอดีต โปรดปรึกษาแพทย์ที่รักษาประจำก่อน และโปรดแจ้งแก่แพทย์ที่ตรวจสุขภาพก่อนรับการฉีดวัคซีนด้วยว่า “แพทย์ประจำแจ้งว่าสามารถรับการฉีดได้”
- ※ หากท่านตั้งครรภ์ หรือมีโอกาสตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ที่รักษาประจำก่อน และโปรดแจ้งแก่แพทย์ที่ตรวจสุขภาพก่อนรับการฉีดวัคซีนด้วยว่า “แพทย์ประจำแจ้งว่าสามารถรับการฉีดได้”

## 【วิธีการฉีดวัคซีน】

ผู้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป ฉีด 0.3 mL ต่อโดส หลังจากฉีดโดสที่ 1 แล้วจะเว้นระยะ 3 สัปดาห์ก่อนฉีดโดสที่ 2 (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ชัดเจน) ภูมิคุ้มกันจะยังไม่เพียงพอจนกว่าจะครบเวลาประมาณ 7 วันหลังจากฉีดวัคซีนโดสที่สอง

## 【ยาต้านการแข็งตัวของเลือด】 ยาที่ต้องระวังในการใช้

- ◇ ワーファリン ยาแวนาร์ฟาริน (Warfarin)
- ◇ プラザキサ ยาพราซาซา/ดาบิกาทราน (Prazaxa/Dabigatran)
- ◇ イグザレルト ยาซาเรลโต/ไรวาร์็อกซาเบน (Xarelto/Rivaroxaban)
- ◇ エリキュース ยาเอลิควิส/อะพิซาเบน (Eliquis/ Apixaban)
- ◇ リクシアナ ยาเล็กเซียนา (Lixiana/)

## 【สารประกอบในวัคซีน】

มีส่วนผสมของสารเคมีที่เรียกว่าโพลีเอทิลีน ไกลคอล (polyethylene glycol – PEG) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อเป็นตัวทำละลายในยาหลายชนิด เช่น ในยาระบายก่อนส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

## 【ผลข้างเคียงจากวัคซีน】

ผลข้างเคียงคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับร่างกายนอกเหนือจากการ “สร้างภูมิคุ้มกัน” ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงหลักของวัคซีนชนิดนี้ ได้แก่อาการปวดในบริเวณที่ฉีด, ปวดหัว, อาการปวดที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อ, ความเมื่อยล้า, หนาวสั่นและมีไข้ ผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อาการช็อก หรืออาการแพ้รุนแรงเฉียบพลัน เนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดใหม่ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการที่ยังไม่พบชัดเจน หากสังเกตว่ามีอาการอื่นที่กังวลหลังจากฉีดวัคซีน โปรดปรึกษาแพทย์ที่ฉีดวัคซีนหรือแพทย์ที่รักษาประจำ

### \* แอนาฟิแล็กซิส

คือปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลันเมื่อร่างกายได้รับอาหารหรือยาบางชนิดเข้าสู่ร่างกาย อาจเกิดอาการเฉียบพลันทางผิวหนังเช่น ลมพิษ, อาการเฉียบพลันในระบบขับถ่าย เช่น ปวดท้องหรือท้องเสีย, หรืออาการเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจติดขัด หากเกิดอาการความดันเลือดต่ำหรือมีนงง(เรียกแล้วไม่ตอบสนอง) กรณีนี้จะเรียกว่า แอนาฟิแล็กซิส

## 【การเยียวยาหากเกิดผลข้างเคียงรุนแรง】

หากผู้ที่รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการฉีดวัคซีน จะได้รับเงินเยียวยาค่ารักษาพยาบาลหรือเงินบำนาญของผู้ที่พาลาตามวิธีการรับวัคซีน

วันจัดพิมพ์ 1 มิถุนายน 2564  
แผนกส่งเสริมสุขภาพอำเภอชิมะ