

定期予防接種(A類疾病)種類および接種対象年齢一覧表

予防接種の種類	接種済 ☑	接種回数	接種対象年齢 【カッコ内:標準的な接種年齢】
ロタウイルス		ロタウイルス 1回目	ロタリックス(2回接種): 出生6週0日後から24週0日後まで ロタテック(3回接種): 出生6週0日後から32週0日後まで 【初回接種開始は、生後2か月から出生14週6日後まで】
		ロタウイルス 2回目	
		ロタウイルス 3回目	
		※ロタテックの場合のみ	
B型肝炎		B型肝炎 1回目	生後12か月(1歳)未満 【生後2か月から生後9か月未満】
		B型肝炎 2回目	
		B型肝炎 3回目	
ヒブ(Hib)		ヒブ初回 1回目	生後2か月から生後60か月(5歳)未満 【初回接種開始は、生後2か月から生後7か月未満】 【追加接種は、初回接種終了後、7か月から13か月までの間隔をおく】
		ヒブ初回 2回目	
		ヒブ初回 3回目	
		ヒブ追加	
小児用肺炎球菌		小児用肺炎球菌初回 1回目	生後2か月から生後60か月(5歳)未満 【初回接種開始は、生後2か月から生後7か月未満】 【追加接種は、生後12か月から生後15か月未満】
		小児用肺炎球菌初回 2回目	
		小児用肺炎球菌初回 3回目	
		小児用肺炎球菌追加	
[四種混合] ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ (DPT-IPV)		四種混合 1期初回 1回目	生後2か月から生後90か月(7歳6か月)未満 【初回接種の3回は、生後2か月から生後12か月未満】 【追加接種は、初回接種(3回)終了後、12か月から18か月までの間隔をおく】
		四種混合 1期初回 2回目	
		四種混合 1期初回 3回目	
		四種混合 1期追加	
[五種混合] ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ・ヒブ R6.4月1日から定期接種化		五種混合 1期初回 1回目	生後2か月から生後90か月(7歳6か月)未満 【初回接種開始は、生後2か月から生後7か月未満】 【追加接種は、初回接種(3回)終了後、6か月から18か月までの間隔をおく】
		五種混合 1期初回 2回目	
		五種混合 1期初回 3回目	
		五種混合 1期追加	
結核		BCG	生後12か月未満【生後5か月から生後8か月未満】
麻しん 風しん		MR 1期	生後12か月から生後24か月(2歳)未満
		MR 2期	5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の1年前から小学校就学までの間 ※志摩市では、5歳児(年長児)を対象に勧奨しています。
水痘		水痘 1回目	生後12か月から生後36か月(3歳)未満 【1回目の接種は、生後12か月から生後15か月未満】
		水痘 2回目	【2回目の接種は、1回目の接種終了後6か月から12か月の間隔をおく】
日本脳炎		日本脳炎 1期初回 1回目	生後6か月から生後90か月(7歳6か月)未満 【初回接種の2回は、3歳以上4歳未満】 【追加接種は、4歳以上5歳未満】
		日本脳炎 1期初回 2回目	
		日本脳炎 1期追加	
日本脳炎		日本脳炎 2期	9歳以上13歳未満【9歳以上10歳未満】 ※志摩市では、小学4年生を対象に勧奨(個別通知)しています。
ジフテリア 破傷風		DT 2期	11歳以上13歳未満【11歳以上12歳未満】 ※志摩市では、小学6年生を対象に勧奨(個別通知)しています。
ヒトパピローマウイルス 感染症		HPV 1回目	・小学6年生から高校1年生(女子)【中学1年生の年度中】 ※志摩市では、中学1年生を対象に勧奨(個別通知)しています。
		HPV 2回目	・キャッチアップ接種の経過措置対象者 平成9年4月2日～H21年4月1日までの間に生まれた女子で、令和4年4月1日～令和7年3月31日までの間に、1回以上接種した人 ※キャッチアップの接種経過措置者は令和8年3月31日まで公費負担で接種可能
		HPV 3回目	

【問い合わせ先】

志摩市 健康推進課(保健センター)

電話番号:0599-44-1100

FAX:0599-44-1102



令和7年4月作成