

# 定期予防接種(A類疾病)種類および接種対象年齢一覧表

予防接種の種類	接種済 ☑	接種回数	接種対象年齢 【カッコ内:標準的な接種年齢】
RSウイルス (母子免疫ワクチン)		組換えRSウイルスワクチン (アプリスポ)	妊娠28週0日から36週6日までの妊婦 ※母子免疫ワクチンとは、妊婦が接種することで、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行し、生まれた乳児が出生時から病原体への予防効果を得ることができるワクチンです。
ロタウイルス		ロタウイルス 1回目 ロタウイルス 2回目 ロタウイルス 3回目 ※ロタテックの場合のみ	ロタリックス(2回接種) : 出生6週0日後から24週0日後までの間 ロタテック(3回接種) : 出生6週0日後から32週0日後までの間 【初回接種は、生後2月に至った日から出生14週6日後までの間】
B型肝炎		B型肝炎 1回目 B型肝炎 2回目 B型肝炎 3回目	1歳に至るまでの間 【生後2月に至った時から生後9か月に至るまでの間】
小児用肺炎球菌		小児用肺炎球菌初回 1回目 小児用肺炎球菌初回 2回目 小児用肺炎球菌初回 3回目 小児用肺炎球菌追加	生後2月から生後60月(5歳)に至るまでの間 【初回接種開始は、生後2月から生後7月に至るまでの間】 【追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔を置いて生後12月から生後15月に至るまで】
[五種混合] ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ・ヒブ (DPT-IPV-Hib)		五種混合 1期初回 1回目 五種混合 1期初回 2回目 五種混合 1期初回 3回目 五種混合 1期追加	生後2月から生後90月(7歳6か月)に至るまでの間 【初回接種開始は、生後2月から生後7月に至るまでの間】 【追加接種は、初回接種終了後、6月から18月までの間隔をおく】 ※四種混合(DPT-IPV)とヒブ(Hib)を4回接種している場合は、五種混合を接種する必要はありません。
結核		BCG	1歳に至るまでの間 【生後5月から生後8月に至るまでの間】
麻しん 風しん		MR 1期 MR 2期	生後12月(1歳)から生後24月(2歳)に至るまでの間 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の1年前から小学校就学までの間 ※志摩市では、5歳児(年長児)を対象に勧奨しています。
水痘		水痘 1回目 水痘 2回目	生後12月から生後36月(3歳)に至るまでの間 【1回目の接種は、生後12月から生後15月に達するまで】 【2回目の接種は、1回目の接種終了後6月から12月までの間隔をおく】
日本脳炎		日本脳炎 1期初回 1回目 日本脳炎 1期初回 2回目 日本脳炎 1期追加	生後6月から生後90月(7歳6か月)に至るまでの間 【初回接種の2回は、3歳に達したときから4歳に達するまでの期間】 【追加接種は、4歳に達した時から5歳に達するまでの期間】
日本脳炎		日本脳炎 2期	9歳以上13歳未満 【9歳に達したときから10歳に達するまでの期間】 ※志摩市では、小学4年生を対象に勧奨(個別通知)しています。
ジフテリア 破傷風		DT 2期	11歳以上13歳未満 【11歳に達したときから12歳に達するまでの期間】 ※志摩市では、小学6年生を対象に勧奨(個別通知)しています。
ヒトパピローマウイルス 感染症		HPV 1回目 HPV 2回目 HPV 3回目	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子【中学1年生の年度中】 ※志摩市では、中学1年生を対象に勧奨(個別通知)しています。

【問い合わせ先】  
志摩市 健康推進課(保健センター)  
電話番号:0599-44-1100  
FAX:0599-44-1102



令和8年3月作成