



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、6/6に調査した的矢湾と6/24に調査した鳥羽海域では22~24℃台、6/24に調査した英虞湾では25.8℃でした。
- 水深2mの日平均水温は、全ての海域において、4/1から水温が上昇しており、神明では、6/25に25℃を超えました。今後も水温の上昇に注意してください。
- 珪藻類は、鳥羽海域では、6,460細胞/mL（桃取2m）、4,240細胞/mL（小浜2m）が確認されました。



【結果】

|                 |      | 桃取    | 小浜    | 安楽島<br>高山 | 安楽島<br>上手 | 浦村<br>砥谷 | 浦村<br>小田ノ浜 | 浦村<br>大村 | 浦村<br>権現 | 的矢   | 三ヶ所   | 神明            |
|-----------------|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|------|-------|---------------|
| 月日              |      | 6/25  |       |           |           |          |            |          |          | 6/6  |       | 6/24          |
| 時刻              |      | 13:23 | 14:32 | 15:10     | 15:18     | 15:34    | 15:46      | 16:29    | 15:58    | 9:13 | 10:09 | 11:24         |
| 水深 (m)          |      | 13.1  | 8.7   | 14.6      | 17.1      | 8.3      | 7.6        | 10.3     | 7.6      | 13.5 | 7.6   | 4.2           |
| 水温<br>(℃)       | 0.5m | 24.6  | 23.9  | 23.7      | 23.2      | 22.9     | 23.0       | 23.1     | 23.3     | 22.4 | 22.6  | 26.8          |
|                 | 2m   | 24.4  | 23.8  | 23.4      | 23.0      | 22.8     | 22.9       | 22.8     | 22.8     | 22.1 | 22.3  | 25.8          |
|                 | 5m   | 24.2  | 22.8  | 22.8      | 22.8      | 22.6     | 22.6       | 22.5     | 22.4     | 21.6 | 21.5  |               |
|                 | B-1m | 21.3  | 21.9  | 21.8      | 22.0      | 22.5     | 22.4       | 22.0     | 22.6     | 19.0 | 20.5  | 25.2          |
| 塩分<br>(ppt)     | 0.5m | 23.4  | 25.7  | 26.4      | 28.3      | 29.3     | 29.3       | 29.1     | 29.4     | 28.8 | 28.8  | 21.4          |
|                 | 2m   | 24.3  | 26.7  | 27.1      | 28.7      | 29.6     | 29.7       | 30.1     | 30.3     | 29.6 | 29.4  | 31.6          |
|                 | 5m   | 25.0  | 28.2  | 28.7      | 29.4      | 30.3     | 30.5       | 30.8     | 30.9     | 30.6 | 30.7  |               |
|                 | B-1m | 30.5  | 30.4  | 31.7      | 32.2      | 30.8     | 31.1       | 31.6     | 31.3     | 33.3 | 31.9  | 32.1          |
| 溶存酸素量<br>(mg/L) | 0.5m | 9.2   | 8.4   | 8.1       | 7.6       | 7.3      | 7.2        | 7.2      | 7.6      | 8.0  | 7.9   | 7.8           |
|                 | 2m   | 8.8   | 8.3   | 7.7       | 7.5       | 7.1      | 7.1        | 6.6      | 7.3      | 8.2  | 8.0   | 5.6           |
|                 | 5m   | 8.3   | 6.9   | 7.1       | 7.3       | 6.7      | 6.7        | 6.5      | 6.5      | 7.8  | 7.4   |               |
|                 | B-1m | 6.2   | 6.0   | 5.8       | 6.0       | 6.6      | 6.4        | 5.8      | 6.4      | 6.6  | 6.7   | 5.4           |
| 珪藻類<br>(細胞/mL)  | 2m   | 6,460 | 4,240 | 2,270     | 1,450     | 950      | 280        | 440      | 330      | 240  | 540   | 20            |
|                 | 5m   | 2,220 | 930   | 470       | 110       | 0        | 10         | 10       | 200      | 10   | 290   | 230<br>(3.2m) |

水深B-1mとは：海底直上1mの水深です。（例：調査地点の水深が18.6mの場合、B-1mは17.6mです）

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/Lを下回ると異常をきたすものが始まります。