



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- ・水深2mの水温は、27～30℃台でした。
- ・水深2mの日平均水温は、8月中旬～9月上旬にかけて、鳥羽海域では27.0℃前後を、的矢湾では28.0℃前後を推移しています。
- ・珪藻類は、930細胞/mL（的矢2m）、350細胞/mL（神明B-1m）が確認されるなど、8月後半の調査と比べ、多くの地点で増加しました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		9/5								9/13		9/3
時刻		13:15	13:47	14:17	14:33	15:16	15:55	16:26	16:05	11:01	10:30	10:41
水深 (m)		12.4	8.7	12.6	18.5	8.9	8.5	10.3	8.3	12.5	8.3	4.2
水温 (°C)	0.5m	28.5	28.3	27.9	27.2	28.2	28.9	28.1	29.2	29.5	30.0	30.1
	2m	27.7	28.0	27.4	27.2	27.2	27.2	27.5	27.7	28.7	28.9	30.5
	5m	27.6	27.5	27.0	26.9	26.9	27.1	27.2	27.1	27.8	27.8	
	B-1m	27.2	27.1	26.8	26.6	26.8	26.8	26.7	26.8	26.6	27.4	30.4
塩分 (ppt)	0.5m	22.8	24.7	27.5	29.5	28.1	27.3	28.6	26.1	27.7	27.6	24.8
	2m	25.6	25.8	27.7	29.6	29.4	29.2	29.2	29.0	29.5	29.4	31.6
	5m	26.6	27.6	29.0	29.9	29.7	29.4	29.4	29.6	30.3	30.4	
	B-1m	29.4	29.1	29.7	30.6	30.1	30.0	30.1	29.8	32.2	31.0	32.7
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	10.0	9.5	7.7	6.9	8.4	8.6	8.5	8.7	7.3	6.8	8.1
	2m	8.6	9.0	7.3	6.7	6.6	7.7	7.4	8.1	6.6	5.9	6.9
	5m	7.7	7.7	6.1	6.2	6.0	6.5	6.6	6.6	4.8	4.1	
	B-1m	5.4	5.6	5.4	5.2	5.1	5.4	5.4	5.4	3.6	3.3	5.7
珪藻類 (細胞/mL)	2m	170	140	70	50	200	210	100	270	930	50	170
	5m	180	60	130	140	100	240	230	160	0	0	350 (3.2m)

水深B-1mとは：海底直上1mの水深です。（例：調査地点の水深が18.6mの場合、B-1mは17.6mです）

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/Lを下回ると異常をきたすものが出始めます。